



Focolai di Influenza Aviaria in Europa

Misure di riduzione del rischio sul territorio regionale

Gli allevamenti avicoli situati nel territorio dell' Azienda U.l.ss. n. 7 "Pedemontana" che allevano all'aperto **devono provvedere a rinchiudere in pollame all'interno di un edificio dell'azienda.**

Tuttavia, qualora gli allevatori non possano assicurare tale operazione, dovranno almeno attuare le misure di mitigazione del rischio ovvero:

- il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti antipassero, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto;
- il pollame e tutti gli altri volatili in cattività devono essere trasferiti e mantenuti in un altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende;
- il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
- i mangimi e le lettiere per il pollame devono essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

Si invitano tutti gli interessati nel provvedere quanto prima, attenendosi strettamente alle disposizioni normative sopraindicate

Il Direttore del Servizio
Dott. Piovanelli Alberto

